

AMD, 4,70,3

1



CLINICA LA LUZ

GENERAL RODRIGO, 8
91- 553 05 00*
TELEFS. 91- 533 21 00*
91- 533 57 06*
FAX 91- 533 41 27
28003 MADRID

Pág.: 1
Fecha: 04/07/98
Hora: 13:29

PACIENTE : MIGUEL DELIBES SETIEN
DIRECCION : DOS DE MAYO, 10-8º 47004 VALLADOLID
TELEFONO : 300250

FECHA PRUEBA : 02/07/98
HORA PRUEBA : 12:19

MEDICO : ENRIQUE MORENO GONZALEZ
N. REGISTRO : 4198/1998 N. LAB. : 137

HABITACION : 712/1

LABORATORIO

MICROBIOLOGIA

CULTIVO

MUESTRA:

ORINA

SE AISLAN MAS DE 100.000 UFC/ML DE E. COLI.
SE ADJUNTA SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA.

Reg. Mer. Madrid - Tomo 3.861, Folio 23, Hoja 29.428, Inscrip. 1ª - NIF - A-28376333





CLINICA LA LUZ, S. A.

LABORATORIO

GENERAL RODRIGO, 8
28003 MADRID
Teléfonos: { 553 05 00
533 57 06
7/4/98 3312:00
Fax: 533 41 27
Página: 1

SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA

PACIENTE ID: 1374
PACIENTE NOMB: DELIBES SETIEN MIGUEL
MEDICO: MORENO GONZALEZ
SERV.:

MUESTRA #: 9807005
TIPO MUESTRA:
RECOGIDA: // :

AISLADO #: 1 BIOTIPO #: 767 270 141
 FINAL ID: ESCHERICHIA COLI
 RECUENTO:

LEIDO: 07/04/98 12:23 POR:
PANEL: PANEL MIC/ID GRAM NEGATIVO ESP

ANTIMICROBIANO	MIC MCG/ML	INTERP	DOSIFICACION PARA SUERO/TEJIDO BLANDO
AMIKACIN	<=4	S	IV/IM 15mg/kg/dia cada 8-12h
AMPICILLIN	<=4	S	IV/IM 2-12 g/dia cada 4-6h
AMPICILLIN/SULBACTAM	<=4/2	S	IV/IM 4-8 g/dia cada 6h DOSIS EN qms DE AMPICILINA
AZTREONAM	<=0.1	S	IV/IM 1.5-6 g/dia cada 6-8h
CEFAZOLIN	<=2	S	IV/IM 1.5-6 g/dia cada 8h
CEFOTAXIME	<=0.1	S	IV/IM 2-12 q/dia cada 6-8h
CEFOXITIN	<=4	S	IV/IM 2-12 g/dia cada 4-6h
CEFTAZIDIME	<=0.5	S	IV/IM 3-6 g/dia cada 8-12h
CEFUROXIME	<=2	S	IV/IM 2.25-4.5 q/dia cada 6-8h
CHLORAMPHENICOL	<=8	S	PO 1-2 g/dia cada 6h IV 2-4 g/dia cada 6h
CIPROFLOXACIN	<=0.1	S	PO 1-1.5 g/dia cada 12h IV 0.4-0.6 g/dia cada 12h
FOSFOMICINA	<=16	S	
GENTAMICIN	<=1	S	IV/IM 3-5 mg/kg/dia cada 8h
NALIDIXIC ACID	<=4	S	SOLO PARA INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NITROFURANTOIN	<=64	S	SOLO PARA INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NORFLOXACIN	<=1	S	SOLO PARA INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO
OFLOXACIN	<=0.5	S	
PIPERACILLIN	<=16	S	IV 6-24 q/dia cada 4-6h
TICARCILLIN	<=16	S	IV 4-24 g/dia cada 4-6h
TMP/SMX	<=2/38	S	IV 8-20 mg/kg/dia cada 12h DOSIS BASADA EN EL TMP
TOBRAMYCIN	2	S	IV/IM 3-5 mg/kg/dia cada 8h

Reg. Merc. Madrid, T. 3861, Folio 23, Hoja 29,428, Inscryp. 1.º - N.I.F. A-28376333



FUNDACION MIGUEL DELIBES

LABORATORIO
Paciente:

LABORATORIO

CINCUENTA Y DOS

SENSIBILIDAD ANTIBIOTICA

PACIENTE ID: 1074
PACIENTE NOMB: DELIBES SETIEN MIGUEL
MEDIC: MORNO DOMAZEE
SERV:

MUESTRA #: 9807005
TIPO MUESTRA:
REGIDA: VA:

ALCALADO # 1 BIOTIPO #: 707 270 141
FINAL ID: ESCHERICHIA COLI
RECuento:

LEIDO: OXIDACION 12-23
PANEL: PANEL MICRID GRAN NEGATIVO ESP

ANTIBIOTICO	CONCENTRACION	INTERPRETACION	COMENTARIOS PARA SENSIBILIDAD BIANCO
AMIKACIN	<0.4	S	IVIM 15mg/10ml cada 8-12h
AMPCILLIN	<0.4	S	IVIM 2-12 g/dia cada 4-6h
AMPCILLIN/SULBACTAM	<0.4	S	IVIM 4-8 g/dia cada 6h
AZITROMICINA	<0.1	S	POIS RN one BR-AMRIGLINA
CEFALOSPORIN	<0.2	S	IVIM 1.5-3 g/dia cada 6-8h
CEDOTAMIN	<0.1	S	IVIM 1.5-3 g/dia cada 8h
CIPROFLOXACIN	<0.1	S	IVIM 2-12 g/dia cada 6-8h
CIPROFLOXACIN	<0.1	S	IVIM 2-12 g/dia cada 4-6h
CIPROFLOXACIN	<0.2	S	IVIM 3-6 g/dia cada 8-12h
CIPROFLOXACIN	<0.2	S	IVIM 4-25.4 g/dia cada 6-8h
CHLORAMPHENICOL	<0.8	S	PO 1-2 g/dia cada 6h
CIPROFLOXACIN	<0.1	S	IV 1-2 g/dia cada 6h
CIPROFLOXACIN	<0.1	S	PO 1-2 g/dia cada 12h
CIPROFLOXACIN	<0.1	S	IV 0.1-0.2 g/dia cada 12h
SUBAMINON	<0.2	S	
BENTANILIN	<0.1	S	IVIM 3-5 mg/kg/dia cada 6h
NALIDIXIC ACID	<0.4	S	SOL PARA INYECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NETROURANTIN	<0.4	S	SOL PARA INYECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NETROURANTIN	<0.1	S	SOL PARA INYECCIONES DEL TRACTO URINARIO
NETROURANTIN	<0.2	S	
FIRACILLIN	<0.1	S	IV 8-24 g/dia cada 4-6h
TICARILLIN	<0.1	S	IV 4-24 g/dia cada 4-6h
TRM SRM	<2000	S	IV 8-20 mg/kg/dia cada 12h
TROPANACIN	<0.2	S	POIS BASADA EN EL TRM IVIM 3-5 mg/kg/dia cada 6h