

(*Certhia brachydactyla*.)

A pateador. - <sup>Pajaro</sup> ~~Ave~~ (de pequeño tamaño (12 cms), de color pardo y pico largo, punti y curvado. Trepa en espiral por el tronco de los árboles con la tibia cola apretada contra la corteza II. Norteño

Cercotrichas

Pajaro insectivoro

Alzacola. - (~~Alzacola~~ galactotes) - ~~Algo~~ <sup>algo</sup> parecido al <sup>rui señor</sup> ~~del~~ <sup>del</sup> ~~que~~ <sup>se</sup> ~~ve~~ <sup>ve</sup> ~~distintamente~~ <sup>distintamente</sup> ~~por~~ <sup>por</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~cola~~ <sup>cola</sup> en abanico de color rojo amarillento manchada de negro y blanco en el extremo. (15 cms)

Uno de los

Buitrón. - (*Cisticola juncidis*) - ~~Al~~ <sup>Uno de los</sup> ~~mas~~ <sup>mas</sup> ~~pequeños~~ <sup>pequeños</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>los</sup> ~~silvados~~ <sup>silvados</sup> europeos (10 cms). - ~~Es~~ <sup>Muy</sup> ~~reveloso~~ <sup>reveloso</sup> en la época de cría, ~~su~~ <sup>su</sup> ~~color~~ <sup>color</sup> pardo oscuro en garganta y partes inferiores blanquecino y cola corta y redondeada.

Bigotudo. - (*Panurus biarmicus*) - Ave de la familia de los pávidos, <sup>vive en carrizales y otras zonas húmedas</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~los~~ <sup>los</sup> ~~países~~ <sup>países</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~Europa~~ <sup>de</sup> ~~occidental~~ <sup>occidental</sup> ~~y~~ <sup>y</sup> ~~occidental~~ <sup>occidental</sup>. De color leonado por el dorso, ~~en~~ <sup>El</sup> ~~macho~~ <sup>macho</sup> tiene una mancha negra a los lados del pico a modo de un llamativo bigote. (16 cms)

(*Locustella spp*) Pajaro

Buscavla. - ~~Ave~~ <sup>insectivoro</sup> de pequeño tamaño y muy activo. <sup>rojizo</sup> ~~de~~ <sup>de</sup> ~~color~~ <sup>color</sup> pardo ~~con~~ <sup>con</sup> gran habilidad pero se muestra reacio al vuelo II. Pintoje II. Fluvial II. Unicolor II de Gray II. Pallas II. Lanceolada II.



*[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



Canastera.. (*Glareola pratincola*). - Pajaro insectivoro, que divaga en ~~grandes~~ <sup>(buscando alimentos)</sup> bandadas. (A las oscuras, largas y puntiagudas; pies de color pardo oliváceo y las principales características son la cola, profundamente ahorquillada de color negro con base blanca, y sus patas <sup>cortas y</sup> negras. (23 cms.)

Carricero (*Aerocephalus* <sup>spp.</sup> ~~Scirpaceus~~). - Pequeño pájaro insectívoro de color pardo uniforme y anillo ocular blanquezo. Generalmente habita en los cañizales y vegetación próxima al agua <sup>(de 12'5 a 19)</sup> (12'5 cms) || Real || Tordal || Poliglota ||. De Blyth.

Carricero n. - (*Aerocephalus schoenobaenus*). - Pajaro insectívoro que se distingue del carricero común por la lista ocular blanqueza y las partes superiores marcadamente listadas salvo el obispillo (12'5 cms). || Cejudo.

Charrán. - (*Sterna* <sup>spp.</sup> ~~hirundo~~). - Ave acuática, sumamente gracil, de pico <sup>rojo negro</sup> largo y puntiagudo y cola ahorquillada. Abunda en las costas y ciénagas del interior (36 cms). || Artico ||. Rosado ||. Sombrio ||.



... (Llave principal) - Llave interior  
... en forma de ...  
... de color ...  
... en la ...  
... en una ...  
... (2 cm.)

... (Llave principal) - Llave interior  
... de color ...  
... en la ...  
... (2 cm.)

... (Llave principal) - Llave interior  
... de color ...  
... en la ...  
... (2 cm.)

... (Llave principal) - Llave interior  
... de color ...  
... en la ...  
... (2 cm.)



- ARATEADOR.-(*Certhia brach y dactyla*) Pájaro de pequeño tamaño/12 cms/.  
 de cola pardo y pico largo,grácil y curvado.Trepa en espiral  
 por el tronco de los árboles con la tesa cola apretada contra  
 la corteza . Nárteño .
- ALZACOLA .-(*Cercotrichas galactotes*) Pájaro insectívoro algo parecido al  
 ruiseñor del que se distingue por su mayor tamaño y la larga  
 cola en abanico de color rojo avellana manchada de negro y  
 blanco en el extremo( 15. cms.)
- BITRON .- (*Cisticola juncidis*) Uno de los mas pequeños pájaros europeos  
 (10 cms.) Muy receloso en la época de cria. Es de color pardo  
 oscuro con garganta y partes inferiores blancuzcas y cola  
 corta y redondeada.
- BIGOTUDO .-(*Manor<sup>v</sup>us biarmicus*) .-Ave de la familia de los pávidos,vive  
 en carrizales y otras zonas húmedas.De color leonado por el  
 dorso. El macho tiene una mancha negra a los lados del pico  
 a modo de un llamativo bigote (16 cms.)
- BUSCARLA.- (*Locustella spp.*)Pájaro insectívoro de pequeño tamaño y muy  
 activo de color pardo rojizo,vive entre carrizos,juntos y  
 en<sup>e</sup>cas, donde se mueve con gran agilidad pero se muestra reacio  
 al vuelo .-Pintojo . Fluvial. Unicolor .-de Gray =Pallas=  
 Lanceolado.
- CANASTERA .-(*Glareola pratincola*)Pájaro insectívoro, que divaga en bandadas  
 buscando alimentos.A las oscuras largas y puntiagudas ;es de  
 color pardo olivaceo y sus principales características son la  
 cola,profundamente ahorquillada de color negro con base blanca  
 y sus patas cortas y negras (23 cms).
- CARRIC<sup>E</sup>ARO.- (*A<sup>e</sup>rocephalus spp*): Pequeño pájaro insectívoro de color pardo  
 uniforme y anillo <sup>e</sup>cular blancuzco. Generalmente habita en  
 los carrizales y vegetación próxima al agua de 12'5 a 19  
 cms. .-Real -.Tordal<sup>e</sup>-.Poliglota .-De Blyth.



AGATEADOR. - (Ceryle alcyon) Pájaro de pequeño tamaño (13 cms.)  
de color verde y pico largo, grácil y curvado. Troca en espiral  
por el tronco de los árboles con la línea azul azulesca contra  
la cabeza. - Matorral.

ALACOLA. - (Ceryle alcyon) Pájaro insectívoro cuyo parecido al  
ruiseñor del que se distingue por su mayor tamaño y la larga  
cola en abanico de color rojo avellana manchada de negro y  
blanco en el extremo (15. cms.)

SURFON. - (Elanus leucurus) Uno de las más pequeñas aves de Europa  
(10 cms.) Muy veloz en la época de cría. Es de color verde  
oscuro con garganta y partes inferiores blancas y cola  
rojo y redondeada.

NICTALO. - (Nictalos leucurus) - Ave de la familia de los pívicos, vive  
en carizales y otras zonas húmedas. De color leonado por el  
dorso. El pecho tiene una mancha roja o las loras del pico  
rojo en la época de cría (15 cms.)

SUCALIA. - (Luscinia sibilatrix) Pájaro insectívoro de pequeño tamaño y muy  
activo de color verde rojizo, vive entre carizales, juncos y  
arbores, donde se cría con gran agilidad para su especie rasca  
el suelo. - Pájaros. - De Bay y otras  
zonas húmedas.

CANARIERA. - (Sylvia melanocephala) Pájaro insectívoro, que divaga en bandadas  
buscando alimentos. A las orillas de los ríos y humedales; en la  
zona de las algarobas y sus principales características son la  
cola, profundamente empuñada de color negro con base blanca  
y sus partes inferiores y negras (13 cms.)

CANARIERA. - (Sylvia melanocephala) Pájaro insectívoro de color verde  
uniforme y cuello blanco manchado. Generalmente habita en  
las carizales y vegetación próxima al agua de 12'5 a 15  
cms. - Bay y otras. - De Bay.



<sup>ARR</sup>  
CERVICERIN.-(<sup>C</sup>Aprocephalus schoenobaenus).-Pájaro insectívoro que se distingue del cervicero común por la lista ocular blancuzca y las partes superiores marcadamente listadas salvo el obispillo(12<sup>a</sup>5 cms)= Cejudo.-

CHARRAN .- (Sterna spp).-Ave acuática, sumamente grácil, de pico rojo o negro, largo y puntiagudo y cola ahorquillada. Abunda en las costas y ciertas aguas del interior( 36 ctms).-Artico. Rosado.-Sombrio.-



CEBUICERIN.-(Atrypa acronotus).-Folios insectivoro que se  
 distingue del anterior como por la línea ocular blanca  
 y las partes superiores marcadamente listadas como el  
 colapso(1285 cas) = Colapso. -  
 CHARRAN. - (Sterna spp.).-Ave acuática, garrucha gris, de pico rojo  
 a negro, largo y puntiagudo y cola ahorquillada. Abunda en  
 las costas y esteros aguas del interior (1285 cas).-Frisco.  
 Rosado.-Sordida. -



Charrancito. - (Sterna albifrons). La mas pequeña de las colondrina de mar (24 cms). Tiene pico amarillo de punta negra, patas amarillas y frente blanca. Cria en las playas, en pequeñas y dispersas colonias

Pajaro muy

Chochin. - (Troglodytes troglodytes) ~~Ave~~ pequeño y rechoncho de color pardo y corta cola levantada. Garbea como un ratón entre la maleza cazando insectos. (9 cms)

spp.)

Chorlitejo. <sup>Grande</sup> ~~Grande~~ (Charadrius hiaticula). - Ave de playa rechoncha y viejosa con ~~el pecho atravesado~~ blanca pechuga adornada por un ancho collar negro. ~~Pico y patas anaranjadas y franja alar blanca (19 cms)~~ ~~Pico y patas anaranjadas y franja alar blanca (19 cms)~~ ~~El chico~~ ~~El Patinegro~~ ~~El chico grande: pico y patas anaranjadas y franja alar blanca (19 cms).~~ ~~El chico: carencia de franja alar y patas color carne. (15 cms)~~ ~~El Patinegro: patas negruzcas y collar incompleto (15 cms).~~

Correlimos. - (Calidris alpina spp.). - El ave de <sup>El color de</sup> playa mas comun en Europa. Su plumaje varia con las estacio-





*[Faint, illegible handwriting in blue ink, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



nes. Pico bastante largo, curvado hacia abajo. Al comer se encorva y engiba (18 cms). || Canelo || De Baird || De Bartram || De Bonaparte || De Temminck || Falcinelo || Gordo || Menudo || Oscuro || Pectoral || Semi-palmado || Tri-dactilo || Zarapitín.

Criato .- (Clamator glandarius) .- Ave de la familia <sup>el</sup> de los cucos, se distingue por su moño ~~de~~ peinado, ~~de~~ color pardo moteado de blanco <sup>de</sup> sus parte superiores y el borde de su larga cola también blanco. Imita las actitudes de la urraca en cuyos nidos pone a menudo sus huevos (40 cms).

Fulmar .- (Fulmarus glacialis) .- Ave ~~de~~ marina parecida a la faviota de la que se distingue por su cuello grueso y por carecer de puntas negras en las estrechas alas. Cria en colonias sobre acantilados o viscos del interior. ~~(45 cms) Poco frecuente~~ Poco frecuente en España. (45 cms.)

Fumarel común (común: Chlidonias niger) - Unica colonarina de mar <sup>cuyo</sup> plumaje nupcial ~~negro~~ ~~excepto~~ ~~en~~ <sup>es</sup> ~~la~~ ~~infraco~~ ~~berbera~~ ~~mis~~ ~~oscuro~~ ~~en~~ ~~su~~ ~~totalidad~~. <sup>El</sup> ~~El~~ plumaje ordinario es blanco en frente, cuello y parte inferior.



... de las ...  
... y ...  
... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...  
... de ...  
... de ...

... (Foliaris glauca) ...  
... de ...  
... de ...  
... de ...

... de ...  
... de ...  
... de ...  
... de ...



rios <sup>con</sup> una mancha gris característica, delante de las alas ~~#~~. Vuela raso sobre el agua y rara vez se zambulle. || Aliblanco || Cariblanco. (24 cms)

Garcilla. - (?) Canhejera y bueyera (no común)  
(26, 27)

(Corvus monedula)

Grajilla. - Ave de la familia de los corvídeos, <sup>y en el pico + corte</sup> ~~pequeña que la graja y la urbeja~~. Negra con anillos y cofete de color gris. ~~Sus ojos gris~~  
Es muy ~~pálido~~ ~~con~~ característico el tono gris pálido de sus ojos (33 cms)

Grévol. - (Tetrastes bonasia) - Ave gallinácea típica pero con la cola muy bien larga y la cabeza ~~crestada~~ típicamente crestada. El plumaje de la parte superior del cuerpo oscila del gris al pardo homogeneamente en las hembras y machos. Parte inferior blanqueces, ~~intermedia de pardo~~ en arboledas. (35 cms.)



*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



4

Lúgano. - (*Carduelis spinus*) .- Pequeño pájaro de arboleda (comiteiras, abedules, alisos), <sup>de</sup> ~~en~~ ~~color~~ (verde amarillento, con pileo y mentón negruzcos. La hembra es mas bien amarilla y carece de manchas negras en la cabeza. Gregario, incluso mezclado con otras especies, en invierno. (12 cms)

Havelda. - (*Clanula hyemalis*) .- Pato marino. Su cuerpo es blanco y las alas oscuras, pardos-negruzcas. <sup>de cabeza pequeña y redonda y</sup> ~~su~~ ~~pico~~ ~~es~~ ~~corto~~ ~~y~~ ~~en~~ ~~la~~ ~~cola~~ ~~tiene~~ ~~unas~~ ~~largas~~ ~~plumas~~ ~~afiladas~~ tiene en la cola y en las alas plumas afiladas. La hembra carece de estas plumas y tiene pileo, pico y mota en carrillo, negr. (58 cms)

Malvasia .- (*Oxyura leucocephala*) .- Único pa- to de cola tiesa en Europa. El macho tiene cabe- za blanca, cuello negro y cuerpo pardo. La hembra, <sup>es</sup> de plumaje más oscuro. Su conducta es escondida.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Havel da..



29. como la familia somorrujos, se vuela a poca altura (45 cms.)

Mito. - (Aegithalos caudatus). - Ave migradora de la familia de los pávidos. Rosado y negro en las partes superiores es blancuzco en debajo. Cola larga, negra, con bordes blancos. Habita en so. For frondosos. (14 cms)

Mosquitero. - (común: Phylloscopus Collybita)

Pájaro insectívoro, hábil, inquieto, pardo por arriba, partes inferiores blanco ocráceas con tenue matiz amarillo limón y patas oscuras. Suele anidar en bosques <sup>poco densos</sup> ~~claros~~ y prados con arbustos, en ramas próximas al suelo. (11 cms) ||

Musical || Troquiloide || Silbador || Papiaboll

Boreal || Bilistado

Negron (común: Melanitta nigra). - Pato marino totalmente negro salvo el pico







6 Negrón (común: *Melanitta nigra*). - Pato marino, total<sup>10</sup>  
mente negro salvo  
la mancha amarillada del pico. Aunque es  
pato de mar, cría al rededor de ~~los~~ lagos y lev.  
nas, en altos páramos o tundras (48 cms)  
|| Especulado || Careto ||

Pájalo.- (*Stercorariidae*). - Familia de gran-  
des aves marinas, parecidas a rapaces, de plu-  
maje oscura y estrechas alas ahuecadas. Pira-  
tas, persiguen a otras aves mas débiles hasta  
hacerlas regurgitar su alimento || Parásito (46  
cms || Grande (59 cms) || Pomarino (54 cms) ||  
Rabero (54 cms).

Palaza (piconetra y piquirroja) ? (173)



from una maucha avarajada.



7  
 Paño .- (Comun: *Hydrobates pelagicus*). - El ave marina mas pequeña de Europa. Negrozco, alas largas, obis pillo blanco muy notorio y cola negra cuadrada. Sigue a <sup>(con su vélo insecular y rápido,</sup> los buques) hasta gran distancia de ~~tierra~~ la costa. En tierra, en uoc. Urna. (15 cms) // De Wilson // De Leach //

Pechiazul .- (*Luscinia svecica*) .- Pajaro parecido al petirrojo en forma y movimiento, tiene la base de la cola de color castaño y, en primavera, un vistoso peto de color azul vivo separado de la parte inferior por franja de color negro y castaño. Habita en espesuras y cria proximo al suelo. (14 cms.)

Unmitero

Papialbo (*Phylloscopus bonelli*) 11 cms // BOREAL (*Phylloscopus borealis*) 12 cms // TROQUILOIDE (*Phylloscopus trochiloides*) 11 cms. // SILBADOR (*Phylloscopus sibilatrix*) 13 cms







81

Ratonero comun (Buteo buteo) : ~~Rat~~ ave rapaz de ala ancha, amplia cola redondeada, color pardo oscuro ~~con~~ manchado de blanco y tarsos amarillos sin plumas. debajo. Vuelo bastante pesado. Se alimenta de humen vertebrado, marahein, carraña a uca, rara vez hajanillos y auida en salientes rocosos, grandes arboles <sup>o</sup> ~~o~~ sobre sus los quebrados (51 a 56 cms). || Calzado (51 a 51  $\frac{2}{3}$  cms)

Roquero ~~(rojo: monticola)~~ : Pájaro de mediano tamaño (19 a 20 cms), de <sup>esquivas</sup> tendencias ~~solitarias~~ que frecuenta los parajes rocosos <sup>las ruinas</sup> y los cortados terreros. ~~Hay~~ Existen dos variedades, el Rojo (monticola saxatilis) y el Solitario (Monticola solitarius), el primero se distingue por su cola rojiza que mece apilamente cuando se posa y el segundo por su plumaje gris azulado que en invierno parece negrozco.



Estos datos comunes (datos comunes): los datos

datos de las áreas, en las que se encuentran  
de color verde oscuro, en las que se encuentran  
y los datos comunes en las áreas.  
datos, los datos comunes, los datos  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran

Estos datos comunes (datos comunes): los datos

datos de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran  
de las áreas, en las que se encuentran



9 - Serín.- (*Serinus canarius*) .- ~~Pequeño frin.~~  
 Ave de la familia de los fringílidos, de peque-  
 ño tamaño y color amarillento listado. Pico  
 rechoncho y obispillo de color amarillo inten-  
 so. Su vuelo, rápido y undulado, se hace cir-  
 cular, con aleteo de murciélago, durante la  
 parada nupcial. Habita y anida en jardi-  
 nes, viñas y entre helmuñes en bucos (11 cms)

Treparriscos.- (*Tichodroma muraria*) Pa-  
 trepador <sup>apil.</sup> ~~apil.~~  
 jaro de la familia de los páridos, ~~muy activo,~~  
 se distingue por <sup>una</sup> ~~la~~ franja de vivo color carmesi  
 sobre sus negruzcas alas redondeadas. Vuelo es  
 pasmado, como de maniposa. Habita en can-  
 tados y entados y anida en grietas profun-  
 das. Tiene un canto armonioso y ~~se~~ sibilante  
 que ejecuta cuando trepa. (15 cms.)

Triquero.- (*Emberiza calandra*) .- ~~Se ave mayor~~  
 de la familia de los ecúbaros, de color <sup>melancólico</sup> ~~melancólico~~  
 bufo, color pardo arenoso listado y ~~pequeño~~ Pico





... (L'histoire de la ville de ...)  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...

... (L'histoire de la ville de ...)  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...

... (L'histoire de la ville de ...)  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...  
... de la ville de ...



Y patas amarillentas que vuelgan cuando  
vuela. Habita en terrenos llanos, cultivados,  
y emite un gorgojo característico como cuando  
se sacude un manjío de llaves. (18 cms.)

Vuelve piedras. - (*Arenaria interpres*). Ave

marina de la familia de los Alcidos, de plu-

x maje "carey", patas amarillentas y punti-

agudo pico negro. Su nombre proviene de la

afición a revolver piedras y conchas en busca

de comida. Habita en estas rocas, principal-

mente en islas litorales. Excepcionalmente, en

la zona litoral, en islas fluviales. (23 cms.)

Zampullin . - (*Podiceps ruficollis*) . - El mas

pequeño de los somormujos pero ~~de~~ mas

robusto ~~Es ave~~ que estos. Trasero como

el cuello y pico cortos. En invierno su plumaje

es pardo oscuro, en auricular y la parte

del costado, se vuelve mucho mas claro, ~~so ca-~~

característico ~~mas delimitado~~ en la base ~~de~~

amarillenta de su pico de la característica ~~mas~~



*[Faint, illegible handwriting, likely bleed-through from the reverse side of the page.]*



11

de limide. Habita y era en charcos, lagos y pantanos.







2

CHARRANCITO (Sterna albifrons). La más pequeña de las golondrinas de mar europeas (24 cms). Tiene pico amarillo de puntas negras, patas amarillas y frente blanca. Cría en playas y marismas en pequeñas y dispersas colonias.

CHOCHIN (Troglodytes troglodytes). Pajaro muy pequeño y rechoncho, de color pardo y corta cola levantada. Garbea como un ratón entre la maleza cazando insectos (9 cms).

CHORLITEJO (Charadrius spp.)// GRANDE (Charadrius hiaticula). Ave de playas y riberas rechoncha y vigorosa con la blanca pechuga adornada por un ancho collar negro. Pico y patas amarillos y franja alar blanca (19 cms). // CHICO (Charadrius dubius) 15 cms. // PATINEGRO (Charadrius alexandrinus) 15 cms.

CORRELIMOS (Calidris spp.) // COMUN (Calidris alpina). El ave de playas <sup>más y más comunes</sup> más común en Europa. El color de su plumaje varía con las estaciones. Pico bastante largo curvado hacia abajo. Al comer se encoge y engiba (18 cms). // DE TEMMINK (Calidris temminckii) 13 cms // GORDO (Calidris canutus) 25 cms. // MENUDO (Calidris minuta) 13 cms // OSCURO (Calidris maritima) 20 cms. // TRIDACTILO (Calidris alba) 20 cms. // ZARAPITIN (Calidris ferruginea) 18 cms.

CRÍALO (Clamator glandarius). Ave de <sup>la</sup> familia de los cucos, se distingue facilmente por su moño ~~despeinado~~, el cola pardo moteado de blanco de sus partes superiores y su larga cola bordeada tambien de blanco. Pone sus huevos en los nidos de las urracas (en ocasiones de otros córvidos), que les incuban y alimentan a los pollos (40 cms.).

FULMAR (Fulmarus glacialis). Ave marina parecida a las gaviotas, de las que se distingue por su <sup>su</sup> ~~cabeza y cuello gruesos~~ <sup>estigmas nasales tubulares</sup>, cola relativamente más corta y alas más estrechas. Existen dos fases, una clara, más numerosa, y otra oscura. Cría en colonias sobre acantilados ~~o riscos del interior~~. Poco frecuente en España (45 cms). <sup>rara en invierno en los mares españoles.</sup>

FUMAREL (Chlidonias spp.)// COMUN (Chlidonias niger). Golondrina de mar con todo el plumaje nupcial oscuro, salvo las partes inferiores de las alas y cola que son blancas. En invierno es blanco en frente, cuello y partes inferiores con una <sup>mancha</sup> ~~mancha~~ <sup>mancha</sup> gris, característica, delante de las alas. Vuela <sup>a baja altura</sup> ~~rasa~~ sobre el agua y <sup>en cuya superficie come</sup> ~~rara vez se zambulle~~ (24 cms). // ALIBLANCO (Chlidonias leucopteres) 24 cms. // CARIBLANCO (Chlidonias hybrida) 24 cms.

GRAJILLA (Corvus monedula). Ave de la familia de los córvidos, más pequeña y con el pico más corto que la graja y la corneja. Negra con auriculares y cogote de color gris. Es muy característico el tono gris pálido de sus ojos. Sociable, forma bandos integrados por muchos ejemplares (33 cms).

GRÉVOL (Tetrastes bonasia). Ave gallinácea típica con la cola más bien larga, y cabeza ligeramente crestada. El plumaje de la parte superior del cuerpo oscila del gris al pardo herrumbre, con listas trasversales pardas y negras. Partes inferiores blancuzcas. El macho tiene la garganta negra. ~~No se ha comprobado su existencia en los Pirineos, y por lo demás,~~ <sup>suspectado actual</sup> ~~donde seguramente vivía en tiempos pasados.~~



CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...

CHIMIZITO (*Stenobothrus*)... Ave de la familia de las...



falta en España, Habita <sup>bosques</sup> en arboledas (35 cms).

*Handwritten scribble*

LUGANO (Carduelis spinus). Pequeño pájaro forestal de la familia de los fringílidos, de color verde amarillento, <sup>de pecho</sup> con píleo y mentón negruzcos. La hembra es menos amarilla y carece de manchas negras en la cabeza. Gregario, incluso mezclado con otras especies, en invierno (12 cms.).

HAVELDA (Clangula hyemalis). Pato marino. Su cuerpo es blanco y las alas oscuras, pardo negruzcas. De cabeza pequeña y redonda y pico corto, tiene en la cola largas plumas afiladas. La hembra carece de estas plumas y tiene píleo, pico y mota en carrillo, <sup>negruzco</sup> negros. Anida en la tundra (53 cms).

MITO (Aegithalos caudatus). Pequeño pájaro de la familia de los páridos. Pardo rosado y negro en las partes superiores, es blanquizco por debajo. Cola muy larga, negra con bordes blancos. Habita en bosques, sotos, jardines, etc. (14 cms).

Diminuto

MOSQUITERO (Phylloscopus spp.) // COMUN (Phylloscopus collybita). Pájaro insectívoro, grácil, inquieto, pardo verdoso por arriba, partes inferiores blanco ocráceas con tenue matiz amarillo limón y patas oscuras. Suele anidar en bosques poco densos y prados con arbustos (11 cms). // MUSICAL (Phylloscopus trochilus) 11 cms.//

Musical

~~PAPIALBO (Phylloscopus bonelli) 11 cms. // BOREAL (Phylloscopus borealis) 12 cms. // TROQUILOIDE (Phylloscopus trochiloides) 11 cms. // SILBADOR (Phylloscopus sibilatrix) 13 cms.~~  
PAPIALBO (Phylloscopus bonelli) 11 cms. // BOREAL (Phylloscopus borealis) 12 cms. // TROQUILOIDE (Phylloscopus trochiloides) 11 cms. // SILBADOR (Phylloscopus sibilatrix) 13 cms.



Lata en papel, Kaita en madera (12 cm).  
 Lata (cubierta exterior), pedruzco negro forrado de la familia  
 de los triángulos, de color verde amarillento con púas y  
 negro. La hembra es negra amarilla y carece de manchas negras  
 en la cabeza. Gregario, machos machado por otras especies.  
 (12 cm).

Lata en papel, Kaita en madera (12 cm).  
 Lata (cubierta exterior), pedruzco negro forrado de la familia  
 de los triángulos, de color verde amarillento con púas y  
 negro. La hembra es negra amarilla y carece de manchas negras  
 en la cabeza. Gregario, machos machado por otras especies.  
 (12 cm).

Lata en papel, Kaita en madera (12 cm).  
 Lata (cubierta exterior), pedruzco negro forrado de la familia  
 de los triángulos, de color verde amarillento con púas y  
 negro. La hembra es negra amarilla y carece de manchas negras  
 en la cabeza. Gregario, machos machado por otras especies.  
 (12 cm).



CHARRANCITO. - La mar venenosa de las golondinas de mar europea, mide 23 cms desde el extremo del pico al de la cola. En primavera su pico es amarillo con la punta negra. Patas amarillentas y frente blanca. <sup>(Sterna albifrons)</sup> vive en playas y marismas en Venecia y diversas colonias.

GOLONDRINA ||  $\frac{3}{4}$  de mar (2ª acepción) ~~este nombre~~ <sup>que viene de la pesca,</sup> ~~en las~~ <sup>en las</sup> ~~se designa a diversas especies de aves,~~ <sup>se designa a diversas especies de aves,</sup> ~~de alas largas y estrechas,~~ <sup>de alas largas y estrechas,</sup> ~~cola algo inclinada y pico puntiagudo.~~ <sup>se alimentan de peces,</sup> ~~Se encuentran en las costas,~~ <sup>en las costas,</sup> ~~en el mar.~~

CHOCINO || - Pájaro muy pequeño y rechoncho de color verde y una cinta levantada. Parbea como un ratón en <sup>9 cms</sup> la melaza ~~cerando insectos.~~ (Troglodytes troglodytes).

CHORLITEJO ||. Nombre en las designa a diversas especies <sup>miradoras</sup> de aves de pequeño tamaño, ~~que se encuentran en las costas~~ <sup>en las costas</sup> como rechonchos y patas largas ~~que se encuentran en las costas~~ <sup>en las costas</sup> y riberas. || Grande. - Se caracteriza por su franja alar blanca <sup>corbata negra,</sup>

<sup>19 cms</sup> <sup>14 cms</sup> ~~su~~ <sup>su</sup> ~~pico y patas de color amarillento~~ <sup>pico y patas de color amarillento</sup> ~~anaranjado.~~

(Charadrius hiaticula) || Chico. - De menor tamaño <sup>rosa</sup> ~~que~~ <sup>que</sup> ~~el grande,~~ <sup>el grande,</sup> ~~sin franja alar y patas de color~~ <sup>sin franja alar y patas de color</sup> ~~pa-~~ <sup>pa-</sup> ~~lido~~ <sup>lido</sup> (~~Charadrius~~ Charadrius dubius) || Patinegro. - Se distingue por <sup>15 cms</sup> ~~su~~ <sup>su</sup> ~~color negro de su pico y la cinta~~ <sup>color negro de su pico y la cinta</sup> ~~negra~~ <sup>negra</sup> ~~en su~~ <sup>en su</sup> ~~plumaje~~ <sup>plumaje</sup> (Charadrius alexandrinus).









2  
19  
ALAR. - Relativo a ~~las~~ las alas.

CORRELIMOS || Nombre común se aplica a diversas especies de aves de tamaño pequeño y mediano, de ~~pequeño~~ pico largo, alas puntiagudas y plumaje diluido, ~~de~~ llamativamente distinto en invierno y en verano, que habitan en playas y marismas (anfosas) <sup>y vuelan en bandadas compactas.</sup> || Común. - El mar ~~abundante~~ numeroso

de la costa europea, plumaje ~~de~~ color verdoso en el dorso y negro en el vientre, ~~durante el verano~~ en primavera y verano y gris en el dorso y blanco en el vientre el resto del año. ~~18 cms~~ 18 cms (Calidris alpina) || Gordo. - 25 cms (Calidris canutus) || ~~Seco~~

Zarapita. - 18 cms (Calidris ferruginea) || Menudo.

14 cms (Calidris minuta) || De Temminck. - 14 cms

(Calidris temminckii) || Tridáctico. - 20 cms (Calidris Alba)

CRÍALO || Ave de la familia de los cucos, se distingue fácilmente por su moño, el color pardo mateado de sus partes superiores y color blanco mateado de sus partes inferiores y color blanco mateado de sus partes inferiores. Pone sus huevos en la hiedra de las cañas y otros corvidos que les incuban y alimentan a los







pollos, 40 cms (Clamator glandarius)

FULMAR || Ave marina parecida a las fariotas de las que se distingue por sus vitílicos uales tubulares. <sup>Exis-</sup>  
ten del tipo, uno claro, mas numeroso, y <sup>paudo</sup> ~~los~~ oscuro  
el otro. Vía en colonias sobre acantilados marinos. ~~2~~  
~~en invierno~~ 45 cms. (Fulmarus glacialis)

FUMAREZ || Nombre que se da a diversas especies de Colodinas de mar de Menores Fumero, mas  
documentadas en las interiores. || Común. - Plumaje  
en plumaje estival, oscuro salvo las partes inferiores de  
alas y cola, blanca. En invierno es blanco en frente, cuello  
y partes inferiores en una hermosa mancha gris caracteris-  
tica delante de las alas. 24 cms (~~Chlidonias~~ (Chli-  
donias niger) || Cariblanco. ~~24 cms~~ (Chlidonias  
hybrida) || Aliblanco. (Chlidonias leucopterus)

GRAJILLA . - Ave de la familia de los córvidos, mas pe-  
queña y en el pico mas corto que la raja y la cuveja.  
Nepa un auricular y el ojo de color gris. Lo muy caracteris-  
tico el iris palido de un ojo. Sociable, forma bandos  
muy nutridos. 33 cms (Corvus monedula)







4

GRAJA (1ª Aceptación) Ave de la familia de los corvidos, de color negro ~~en todo el cuerpo~~ <sup>y</sup> lustre irisado, ~~en~~ el pico ~~amplificado~~ y la parte inferior de la cara calva. ~~y patida~~. A veces en colonias y alimenta la canchales.

Habita .- 46 cms (Corvus frugilegus)

Tipica ave forestal

GRÉVOL, - ~~Ave~~ (Pallinaea tibia) (en la cola muy bien la parte


y cabeza ligeramente crestada. El plumaje de la parte superior ~~rojo~~ <sup>rojizo</sup>, en las partes inferiores pardo y negro. Partes inferiores blancuzcas. El macho tiene la garganta negra. Se reproduce en existencia en los Pirineos donde vivía en tiempos pasados.

~~Habita~~ 35 cms (Tetrastes bonasia)

LUGANO II Pequeño pájaro forestal de la familia de los fringílidos de color verde amarillento en vuelo y muy fofu negro en la hembra es un amarillo y cauce de manchas negras en la cabeza. Prepara en invierno, incluso murallas en otros lugares. 12 cms (Carduelis spinus).

MITO .- Pequeño pájaro de la familia de los paridos.

Pardo rosado y negro en las partes superiores <sup>el blanco</sup> y de bajo. Cola muy larga, negro en partes blancas.









S  
Habita en bosques, rotos, jardines etc. - 14 cms (Aegithalos caudatus) . -

PARIDOS, DAS. m. y f. Pl. Zool. Familia de aves que comprende carboneos, henerillos y otros especies de <sup>cola larga</sup> Fameno y pico entos con conico.

MOSQUITERO . - Nombre en su a decique a diuvar u-  
Neces de pajarr inectivos de muy pequeño Fameno, há-  
eiles, inuistrs, de cola uedro amarrkento y pico  
~~trio~~ hátil y ento, interhadu en el género Phyllos-  
copus . || Común . # - se distingue un ~~an eja blan-~~  
~~evete~~ un hatar uenzar y su voz muy característi-  
ca . # 11 cms ( Phylloscopus collybita ) || . - Mu-  
sical . - 11 cms ( Phylloscopus trochilus ) || Pa-  
pialbo . - 11 cms ( Phylloscopus bonelli ) || Bo-  
real - 12 cms ( Phylloscopus borealis ) || Tro-  
quiloide . 11 cms ( Phylloscopus trochiloides ) ||  
Silbador . 13 cms ( Phylloscopus sibilatrix ) .







2a. edición  
Inmengué a Alvar

ADICIONES

CHARRANCITO.-La mas pequeña de las golondrinas de mar europeas, mide 23 centímetros desde el extremo del pico al de la cola. En primavera su pico es amarillo con la punta negra. Patas amarillentas y frente blanca. Cría en playas y marismas en pequeñas y dispersas colonias (Sterna albifrons)

GOLONDRINA DE MAR.- Nombre con que se designa a diversas especies de aves esbeltas, de alas largas y estrechas, cola ahorquillada y pico puntiagudo, que habitan próximas al agua y se alimentan de peces. Anidan en colonias, en el suelo.

CHUCHÍN.-Pájaro muy pequeño y rechoncho de color pardo y cola corta, levantada. Garbea como un ratón entre la maleza cazando insectos. 9 centímetros. (Troglodytes troglodytes)

CHORLITEJO.- Nombre con que se designa a diversas especies de aves migradoras de pequeño tamaño, cuerpo rechoncho y patas largas que frecuentan playas y riberas. || GRANDE. Se caracteriza por su franja alar blanca, corbata negra y pico y patas de color anaranjado. 19 centímetros. (Charadrius hiaticula). || CHICO. De menor tamaño que el grande, sin franja alar y patas de color rosa pálido. 15 centímetros. (Charadrius dubius). || PATINEGROS. Se distingue por el color negro de sus patas y la corbata negra incompleta. 15 centímetros. (Charadrius alexandrinus).

ALAR.-Relativo a las alas

CORRELIMOS.-Nombre con que se designa a diversas especies de aves de tamaños pequeño y mediano, de pico largo, alas puntiagudas y plumaje diverso, llamativamente distinto en invierno y en verano, que habitan en playas y marismas fangosas y vuelan en bandadas compactas. || COMUN. El mas numeroso de los correlimos europeos, plumaje color herrumbroso en el dorso y negro en el vientre en primavera y verano, y gris en el dorso y blanco en el vientre el resto del año. 18 centímetros. (Calidris alpina). || GORDO ~~Calidris~~ 25 centímetros. (Calidris canutus). - || ZARAPITÍN .18 centímetros. (Calidris ferruginea) || -MENUDO. 14 centímetros. (Calidris minuta) || -DE TEMMINCK. 14 centímetros. (Calidris temmincki) || -TRIDÁCTICO. 20 centímetros. (Calidris alba).

CRÍALO.-Ave de la familia de los cucos, se distingue facilmente por su moño, el color pardo moteado de sus partes superiores y la larga cola bordeada

MIGUEL DELIBES  
EUDACÓN  
También



3.5. 1911  
Miguel Delibes  
Fundación

CHARRANCITO.-La mas pequeña de las golondrinas de mar europeas, mide 25 centímetros desde el extremo del pico al de la cola. En primavera su pico es amarillo con la punta negra. Patas amarillentas y frente blan ca. Cría en playas y marismas en pedruzcos y dispersas colonias (Sterns albilrona)

GOLONDRIÑA DE MAR.- Nombre con que se designa a diversas especies de aves esbeltas, de alas largas y estrechas, cola ahorquillada y pico puntiagudo, que habitan próximas al agua y se alimentan de peces. Anidan en colonias, en el suelo. CHOCÓN.-Pájaro muy pequeño y rechoncho de color pardo y cola corta, levanta garbas como un ratón entre la maleza cazando insectos. 9 centímetros. (Trogodytes troglodytes)

CHORLITO.- Nombre con que se designa a diversas especies de aves migratorias de pequeño tamaño, cuerpo rechoncho y patas largas que frecuentan playas y riberas. GRANDE. Se caracteriza por su alta alar blanca, corbata negra y pico y patas de color anaranjado. 19 centímetros. (Charadrius hiaticula). CHICO. De menor tamaño que el grande, sin banda alar y patas de color ros pálido. 15 centímetros. (Charadrius dubius). Se distingue por el color negro de sus patas y la corbata negra incompleta. 15 centímetros. (Charadrius alexandrinus).

Charadriidae - Relative to the alba

CORRELIMOS.-Nombre con que se designa a diversas especies de aves de tamaño pequeño y mediano, de pico largo, alas puntiagudas y plumaje diverso, llamativamente distinto en invierno y en verano, que habitan en playas y marismas tancaas y vuelan en bandadas compactas. COMUN. El mas numeroso de los correlimos europeos, plumaje color herrumbroso en el dorso y negro en el vientre en primavera y verano, y gris en el dorso y blanco en el vientre el resto del año. 18 centímetros. (Calidris alpina). GORDO. 25 centímetros. (Calidris canutus). ZARAPITIN. 18 centímetros. (Calidris ferruginea). MENDUO. 14 centímetros. (Calidris minuta). DE TERNINCK. 14 centímetros. (Calidris temminckii). TRIDACTICO. 20 centímetros. (Calidris alba).

CRALDO.-Ave de la familia de los cuacos, se distingue facilmente por su moño, el color pardo moteado de sus partes superiores y la larga cola bordeada también



de blanco. Pone sus huevos en los nidos de las urracas y otros córvidos que les incuban y alimentan a los pollos. 40 centímetros. (Clamator glandarius).

FULMAR.-Ave marina parecida a las gaviotas de mar que se distingue por sus orificios nasales tubulares. Existen dos tipos, uno claro, mas numeroso y, otro, pardo oscuro. Cría en colonias sobre acantilados marinos. 45 centímetros. (Fulmarus glacialis).

FUMAREL.-Nombre con que se designa a diversas especies de golondrinas de mar de pequeño tamaño, mas frecuentes en aguas interiores. || COMUN. Inconfundible en plumaje estival, oscuro salvo las partes inferiores de alas y cola, blancas. En invierno blanco en frente, cuello y partes inferiores con una pequeña mancha gris característica delante de las alas. 24 centímetros. (Chlidonias niger). || CARIBLANCO (Chlidonias hybrida) || -ALIBLANCO. (Chlidonias leucopterus).

GRAJILLA.-Ave de la familia de los córvidos, mas pequeña y con el pico mas corto que la graja y la corneja. Negra con auriculares y cogote de color gris. Es muy característico el gris pálido de sus ojos. Sociable, forma bandos muy nutridos. 33 centímetros. (Corvus monedula).

GRAJA.-(1ª acepción) Ave de la familia de los córvidos, de color negro y lustre irisado, con el pico puntiagudo y la parte inferior de la cara pelada. Anida en colonias y frecuenta los campos cultivados. 46 centímetros. (Corvus frufilegus)

GREVOL.-Típica ave gallinácea forestal con la cola mas bien larga y la cabeza ligeramente crestada. El plumaje de la parte superior del cuerpo oscila del gris al pardo rojizo, con listas transversales pardas y negras. Partes inferiores blancuzcas, el macho tiene la garganta negra. Se sospecha su existencia en los Pirineos donde vivía en tiempos pasados. 35 centímetros. (Tetrastes bonasia).

LÚGANO.-Pequeño pájaro forestal de la familia de los fringílidos de color verde amarillento con píleo y mentón negruzcos. La hembra es menos amarilla y carece de manchas negras en la cabeza. Gregario en invierno, incluso mezclado con otras especies. 12 centímetros. (Carduelis spinus).

MITO.- Pequeño pájaro de la familia de los páridos. Pardo rosado y negro en las partes superiores, es blanco por debajo. Cola muy larga, negra con bordes blancos. Habita en bosques, sotos, jardines etc. 14 centímetros. (Aegithalos caudatus).



de blanco. Pone sus huevos en los nidos de las urracas y otros córvidos que les inclinan y alimentan a los pollos. 40 centímetros. (Ciamator glandarius).

FUMAR. - Ave marina parecida a las gavotas de las que se distingue por sus orificios nasales tubulares. Existen dos tipos, uno claro, mas numeroso y, otro, pardo oscuro. Cría en colonias sobre acantilados marinos. 45 centímetros. (Fumarus glacialis).

FUMAR. - Nombre con que se designa a diversas especies de góndrinas de mar de pequeño tamaño, mas frecuentes en aguas interiores. COMUN. Inconfundible en plumaje estival, oscuro salvo las partes inferiores de alas y cola, blancas. En invierno blanco en frente, cuello y partes inferiores con una pequeña mancha gris característica delante de las alas. 24 centímetros. (Chlidonias niger). CARIBLANCO (Chlidonias hybrida). ALIBLANCO. (Chlidonias leucoptera).

GRUJILLA. - Ave de la familia de los córvidos, mas pequeña y con el pico mas corto que la graja y la corneta. Negra con anilluras y cogote de color gris. Es muy característico el gris pálido de sus ojos. Social, forma bandos muy nutridos. 33 centímetros. (Corvus monedula).

GRAJA. - (In acepción) Ave de la familia de los córvidos, de color negro y lustre irisado, con el pico puntiagudo y la parte inferior de la carpelada. Anida en colonias y frecuenta los campos cultivados. 46 centímetros. (Corvus frugilegus).

GRUJO. - Típica ave gallinésca forestal con la cola mas bien larga y la cabeza ligeramente crestada. El plumaje de la parte superior del cuerpo oscila del gris al pardo rojizo, con listas transversales pardas y negras. Partes inferiores blancuzcas, el macho tiene la garganta negra. Se sospecha su existencia en los Pirineos donde vivía en tiempos pasados. 35 centímetros. (Tetrastes bonasia).

LUGANO. - Pequeño pájaro forestal de la familia de los fringílidos de color verde amarillento con pico y mentón negruzcos. La hembra es menos amarilla y carece de manchas negras en la cabeza. Gregario en invierno, incluso mezclado con otras especies. 12 centímetros. (Carduelis spinus).

MITO. - Pequeño pájaro de la familia de los páridos. Pardo rosado y negro en las partes superiores, es blanco por debajo. Cola muy larga, negra con bordes blancos habita en bosques, sotobosques, jardines etc. 14 centímetros. (Agithales candatus).



~~PÁRIDOS, DAS.-M. y f.pl. Zool- Familia de aves que comprende carboneros, hervrerillos y otras especies de pequeño tamaño, cola larga y pico corto casi cónico.~~

MOSQUITERO.-Nombre con que se designa a diversas especies de pájaros insectívoros de muy pequeño tamaño, gráciles, inquietos, de color verdoso amarillento y pico frágil y corto, integrados en el género *Phylloscopus*. || COMUN. Se distingue por sus patas negruzcas y su voz, en dos tonos, muy característica. 11 centímetros. (*Phylloscopus collybita*) || -MUSICAL. 11 centímetros. (*Phylloscopus trochilus*) || -PAPIALBO. 11 centímetros (*Phylloscopus bonelli*) || -BOREAL. 12 centímetros. (*Phylloscopus borealis*) || -TROQUILOIDE. 11 centímetros. (*Phylloscopus trochiloides*) || -SILBADOR. 13 centímetros. (*Phylloscopus sibilatrix*).

#### ADICIONES COMPLEMENTARIAS

ALAR.- Relativo a las alas

PÁRIDOS.- M. y f. pl. Zool.- Familia de aves que comprende carboneros, hervrerillos y otras especies de pequeño tamaño, cola larga y pico corto, casi cónico.



... familia de aves que comprende carboneros, be-  
... y otras especies de pequeño tamaño, cola larga y pico corto casi  
cónico.

MOSQUITERO. - Nombre con que se designa a diversas especies de pájaros insecti-  
voros de muy pequeño tamaño, gráciles, inquietos, de color verdoso amarillento  
y pico frágil y corto, integrados en el género *Phylloscopus*. COMUN. Se distin-  
gue por sus patas negras y su voz en dos tonos muy características. El cen-  
tímetros. (*Phylloscopus collybita*). - MUSICAL. 11 centímetros. (*Phylloscopus trochi-*  
*lus*). - PAPIALBO. 11 centímetros (*Phylloscopus bonelli*). - BOREAL. 13 centímetros.  
(*Phylloscopus borealis*). - TROQUILOIDE. 11 centímetros. (*Phylloscopus trochi-*  
*loides*). - SIBIRADOR. 13 centímetros. (*Phylloscopus sibilatrix*).

ACTIVIDADES EN PLANTAS

A. A. R. - Relativo a las alas  
... familia de aves que comprende carboneros.  
... y otras especies de pequeño tamaño, cola larga y  
pico corto casi cónico.